

**Методические рекомендации по подготовке к заключительному этапу  
(финалу) открытой универсиады федерального государственного  
автономного образовательного учреждения высшего образования  
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»  
«RUDN-ON» в 2024/2025 уч. г.**

**Предметное направление  
«Химия»**

---

название предметного направления

**1. О предметном направлении**

Универсиада по предметному направлению «Химия» проводится  
направлению подготовки:

- 04.04.01 Химия

Базовые дисциплины:

- *Неорганическая химия;*
- *Аналитическая химия;*
- *Органическая химия;*
- *Физическая химия.*

Специализированные дисциплины:

- *Основы квантовой химии;*
- *Химия координационных соединений;*
- *Спектральные методы анализа;*
- *Строение вещества;*
- *Методы получения новых веществ и материалов;*
- *Стратегия органического синтеза.*

**2. Заключительный этап (финал)**

Заключительный этап универсиады по предметному направлению «Химия» проводится в форме письменной работы. Задания заключительного этапа включают 10 вопросов по базовым и специализированным дисциплинам направления «Химия». Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 10

баллов (максимальная оценка – **100 баллов**). В сумме участник может набрать 100 баллов по итогам заключительного этапа.

На выполнение всего теста отводится 120 минут.

### 3. Критерии оценивания заданий заключительного этапа

№	Критерии оценивания открытых вопросов заключительного этапа	Баллы
1	Полнота и правильность ответа, использование профессиональной терминологии, применимость решения на практике	5
2	Логика и аргументация изложения материала - внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, глубина проработки проблемы (обоснованность и комплексность решения)	5
<b>Итого</b>		10

### 4. Список рекомендуемой литературы для подготовки

1. А.К. Молодкин. Химия элементов IA – VIIIА групп. М.: Изд-во РУДН, 2005, 175с.
2. А.К. Молодкин, Н.Я. Есина, Н.У. Венковский. Химия переходных элементов. М.: Изд-во РУДН, 2007, 368с.
3. Я.А. Угай. Общая и неорганическая химия. М.: В.Ш., 2000, 2004, 528с.
4. М.Х. Карапетьянц, С.И. Дракин. Общая и неорганическая химия. М.: Химия, 2001, 592с.
5. Герасимов Я.И. и др. Курс физической химии:: В 2 т// М.: Химия. 1969. Т.1-2.
6. А.Г. Стромберг, Д.П. Семченко Физическая химия// М: Высшая школа. 2001
7. В.М. Грязнов, С.Г. Гульянова Физическая химия, ч 1//М.: РУДН, 1989/уч.пособие
8. В.М. Грязнов, С.Г. Гульянова Физическая химия, ч 2//М.: РУДН, 1992 /уч.пособие
9. Эткинс П. Физическая химия: В 2 т// М.: Мир, 1980. Т.1, 2.
10. Еремин Е.Н. Основы химической кинетики: Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1976. 374 с.
11. Боженко К.В. Методические указания по изучению курса «Основы квантовой химии», раздел I «Классическая механика» // Учебное пособие. – Изд. РУДН. – 2005. – С.25.
12. Боженко К.В. Методические указания по изучению курса «Основы квантовой химии», раздел II «Квантовая механика» // Учебное пособие. – Изд. РУДН. – 2005. – С.24.
13. Цюлике Л. Квантовая химия. Т. 1: Основы и общие методы/ М.: Мир.- 1976
14. В.Д. Ягодовский Статистическая термодинамика в физической химии // М.: изд. БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2005. – С.495.
15. Шабаров Ю.С. «Органическая химия», М., Химия, 2000 г.
16. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. Вводный курс. М., “Химия”, 2000

17. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. «Органическая химия», т. 1-4, М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г.
18. Илиэл Э., Вайлен С., Дойл М. “Основы органической стереохимии”. пер. с анг., изд. “Бином. Лаборатория знаний”, Москва, 2007 г.
19. Химия ароматических гетероциклических соединений / М.А. Юровская. - 3-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2021.

## 5. Демоверсии заданий заключительного этапа

1. При взаимодействии твердого вещества **A** и газа **B** образуется удушливый газ **AB<sub>3</sub>**. Имеющий кислую реакцию среды водный раствор **СВ**, который нельзя хранить в стеклянной таре, при взаимодействии с **AB<sub>3</sub>** образует кислоту **D**. **NaC** восстанавливает **AB<sub>3</sub>** в соединение **E**, которое имеет ряд гомологов. Расшифруйте указанные в задаче соединения, приведите примеры уравнений соответствующих реакций.
2. На примере валина и фенилаланина покажите применение бензилоксикарбонильной и бензильной защиты для амино- и карбоксильной групп α-аминокислот, которые могут использоваться в синтезе высокомолекулярных органических веществ (белков). В чём заключается преимущество указанных защитных функций?
3. Рассчитайте тепловой эффект реакции:  
 $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$   
 Энергия связи C-H в метане равна 435 кДж/моль, связи C-Cl в хлорметане – 350 кДж/моль, а энергия связи Cl-Cl и H-Cl соответственно равны 240 кДж/моль и 430 кДж/моль.

**На рабочем месте участника не должно быть никаких посторонних предметов, за исключением:**

- один лист бумаги формата А4 для записей (по направлениям, в которых разрешено выполнение работы на листах и/или использование черновиков, число листов не ограничено). Использование других бумажных носителей, например, тетрадей/блокнотов и др., запрещено;
- Ручка (с чернилами черного или синего цвета);
- Таблица Менделеева;
- Калькулятор;
- Вода в прозрачной емкости;
- Необходимые лекарства без упаковки;
- Оригинал документа, удостоверяющего личность.

# ЗАДАНИЯ

заключительного этапа Универсиады РУДН  
по предметному направлению  
**«ХИМИЯ»**

МОСКВА

2025

**Уважаемый участник Универсиады RUDN-ON!**

Перед завершающим этапом призываем обратить особое внимание на критерии оценки, представленные для данного этапа. Не менее важно также быть внимательным при выражении своих ответов. Ваша ясность мысли, точность и полнота ответов, соответствие заданным критериям, будут играть существенную роль в успешном завершении этапа. Желаем Вам сконцентрироваться, проявить все свои знания и умения наилучшим образом и не терять внимания к каждой детали. Удачи Вам в этом завершающем этапе Универсиады «RUDN-ON»!

Заключительный этап универсиады по предметному направлению «Химия» проводится в форме письменной работы. Задания заключительного этапа включают 10 вопросов по базовым и специализированным дисциплинам направления «Химия». Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 10 баллов (максимальная оценка – 100 баллов). В сумме участник может набрать 100 баллов по итогам заключительного этапа.

На выполнение всего теста отводится 120 минут.

### **1. Критерии оценивания заданий заключительного этапа**

<b>№</b>	<b>Критерии оценивания открытых вопросов заключительного этапа</b>	<b>Баллы</b>
1	Полнота и правильность ответа, использование профессиональной терминологии, применимость решения на практике	5
2	Логика и аргументация изложения материала - внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, глубина проработки проблемы (обоснованность и комплексность решения)	5
<b>Итого</b>		<b>10</b>

**На рабочем месте участника не должно быть никаких посторонних предметов, за исключением:**

- один лист бумаги формата А4 для записей (по направлениям, в которых разрешено выполнение работы на листах и/или использование черновиков, число листов не ограничено). Использование других бумажных носителей, например, тетрадей/блокнотов и др., запрещено;
- Ручка (с чернилами черного или синего цвета);
- Таблица Менделеева;
- Калькулятор;
- Вода в прозрачной емкости;
- Необходимые лекарства без упаковки;
- Оригинал документа, удостоверяющего личность.

## Задания заключительного этапа Универсиады «RUDN-ON» по предметному направлению «Химия»

1. В последнее время в СМИ и среди населения приобрела особую популярность тема «экологически чистой» пищи без искусственных «вредных» добавок. Большую долю таких добавок составляют органические соединения (азокрасители, консерванты, вкусоароматические добавки), но и неорганические вещества также широко используются в пищевой промышленности.

Комплексное соединение **A** применяется как добавка, препятствующая слеживанию и комкованию поваренной соли. При кипячении этого соединения в концентрированной соляной кислоте в виде газа выделяется одно из самых токсичных водорастворимых неорганических веществ и образуется светло-зеленый раствор (реакция 1), при стоянии на воздухе приобретающий коричневый цвет (реакция 2).

Соль **B** применяется в мясной промышленности как фиксатор окраски мясных изделий. Без нее колбаса имела бы непривлекательный серый цвет вместо свежего розового. Это соединение может проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства. Соль **B** в кислой среде легко окисляет иодид калия до элементарного иода (реакция 3), но также легко в кислой среде обесцвечивает раствор перманганата калия (реакция 4). Дополнительно известно, что эта соль широко применяется в органическом синтезе для получения диазосоединений из ароматических аминов.

Соль **C** используют как разрыхлитель теста. При выпечке она разлагается, не оставляя твердых продуктов (реакция 5). В XVII веке эту соль использовали в медицине под названием «нюхательная соль», поскольку она обладает выраженным запахом одного из газов, выделяющихся при ее разложении.

Газ **D** применяется как газ-пропеллент во взбитых сливках. Он нетоксичен для организма, обладает сладковатым привкусом и окислительными свойствами: тлеющая лучина в нем вспыхивает, как и в кислороде (реакция 6). Также этот газ хорошо известен каждому гонщику. Его можно получить из соли **B** действием хлорида гидроксилиамина (реакция 7).

Газ **E** используют как консервант для вина. Его водный раствор имеет кислую среду и взаимодействует с солью **B** в кислой среде (реакция 8).

*Определите формулы соединений A-E, напишите уравнения реакций 1-8. Известно, что вещества A, B, C, D содержат один общий элемент Э. Его содержание в A и B составляет 22,8% и 20,3% соответственно. Газы D и E являются бинарными соединениями.*

2. Реагент **A** – известный в препаративной химии восстановитель, способный восстанавливать благородные металлы (например, золото или палладий) из растворов их солей до металлов. При этом выделяется бесцветный газ, являющийся компонентом воздуха. Реагент **A** обычно применяется в виде солей с соляной или серной кислотой, поскольку в свободном виде неустойчив.

Интересны реакции сернокислой соли **A** с соединениями азота в промежуточных степенях окисления. Например, по реакции с азотистой кислотой, образуется кислота **B**. Ее анионы состоят из всего одного элемента. Содержание этого элемента в кислоте **B**, образующей эти соли, равно 97,67 %. Кислота **B** – один из самых сильных восстановителей и довольно сильный окислитель.

- 1) Определите вещества **A** и **B** и изобразите их структурные формулы.
- 2) Напишите уравнения всех реакций. Приведите примеры окислительных и восстановительных способностей кислоты **B** или ее солей.
- 3) Где применяются соли кислоты **B**? Какова их отличительная особенность?

3. Открытие в 1987 году высокотемпературных сверхпроводников произвело настоящую революцию в физике. В отличие от обычных проводников (металлы, графит), эти материалы представляют собой керамики, то есть многокомпонентные оксиды, как правило, нестехиометрического состава.

Для определения состава сверхпроводящей керамики  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$  провели иодометрическое титрование по следующей методике. В колбу, продуваемую аргоном, налили 100 мл 0,1 моль/л  $\text{HCl}$ , добавили 15 мл 1,5 моль/л раствора  $\text{KI}$  и поместили навеску образца массой 100 мг. Раствор перемешивали до полного растворения керамики, затем оттитровали  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  по крахмалу в качестве индикатора. На титрование ушло 5,14 мл 0,100 моль/л раствора  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ .

- 1) Напишите уравнения происходящих реакций.
- 2) Рассчитайте состав керамики и определите формальные степени окисления входящих в ее состав элементов. Какие из элементов, по вашему мнению, придают этой керамике свойства сверхпроводника?

4. Определите конечную температуру  $\text{Ar}$ , если при адиабатическом сжатии давление увеличилось в 10 раз. Начальная температура 298К. Считать, что  $\text{Ar}$  находится в идеальном состоянии.

5. Энергия Гельмгольца одного моля некоторого вещества записывается следующим образом:  $F = a + T(b - c - b\ln T - d\ln V)$ , где  $a, b, c, d$  - константы. Найдите энтропию и теплоемкость  $C_V$  этого тела. Дайте физическую интерпретацию константам  $a, b, d$ .


6. Для реакции  $\text{CH}_3\text{OH} (\text{г}) + \frac{3}{2} \text{O}_2(\text{г}) = \text{CO}_2(\text{г}) + 2 \text{H}_2\text{O} (\text{г})$  зависимость теплового эффекта от температуры выражается уравнением (Дж)

$$\Delta I_{\delta} = -684.71 \cdot 10^3 + 36.77 \times \delta - 38.56 \cdot 10^{-3} \times \delta^2 + 8.21 \cdot 10^{-6} \times \delta^3.$$

Рассчитайте изменение теплоёмкости  $\Delta \tilde{N}_{\delta}$  для этой реакции при 500К.

7. Органическое соединение  $\text{C}_5\text{H}_4\text{O}_2$ , полученное из освобожденных от зерен початков кукурузы, 10% серной кислоты и поваренной соли последовательно обработали боргидридом натрия и треххлористым фосфором. Полученное нестабильное соединение  $\text{C}_5\text{H}_5\text{ClO}$  незамедлительно использовали в реакции с цианистым натрием в воде. Установите строение вещества, полученного из початков кукурузы и выделенного продукта с брутто формулой  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}$ , если известно, что в спектре ЯМР присутствуют 2 дублета при 6.77 и 6.29 м.д. с КССВ 3.2 Гц и синглет при 2.43 м.д., в ИК-спектре характерный пик в области  $\sim 2200 \text{ см}^{-1}$ .

8. На основе простых химических превращений установите строение продуктов следующих реакций, зная, что соединение  $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{N}_2\text{O}_3\text{Br}$  относится к амидам, а  $\text{C}_{13}\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_3$  к гетероциклическим соединениям:



9. Нитрофуразон ( $C_6H_6N_4O_4$ ) – желтый мелкокристаллический порошок обладает антибактериальными свойствами, действует на различные грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы. Его синтез осуществлен на основе соединения с брутто формулой  $C_5H_3NO_4$  и солянокислого семикарбазида. Установите строение исходного соединения, зная, что в его спектре ЯМР присутствуют 2 дублета при 7.43 и 7.36 м.д. с КССВ 3.8 Гц и синглет при 9.85, а в ИК-спектре характерные пики в области 1694, 1538 и 1349  $\text{см}^{-1}$ .

10. Приведите 2 полимера с одним и тем же повторяющимся звеном, который может быть получен как полимеризацией, так и поликонденсацией? Укажите соответствующие мономеры.



Период	Ряд	ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ								Обозначение элемента	Атомный номер									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII											
I	1	(H)						H	<sup>1</sup> 1,00797 Водород	He	<sup>2</sup> 4,0026 Гелий									
II	2	Li Литий	<sup>3</sup> 6,939	Be Бериллий	<sup>4</sup> 9,0122	B Бор	<sup>5</sup> 10,811	C Углерод	<sup>6</sup> 12,01115	N Азот	<sup>7</sup> 14,0067	O Кислород	<sup>8</sup> 15,9994	F Фтор	<sup>9</sup> 18,9984	Ne Неон	<sup>10</sup> 20,179			
III	3	Na Натрий	<sup>11</sup> 22,9898	Mg Магний	<sup>12</sup> 24,305	Al Алюминий	<sup>13</sup> 26,9815	Si Кремний	<sup>14</sup> 28,086	P Фосфор	<sup>15</sup> 30,9738	S Сера	<sup>16</sup> 32,064	Cl Хлор	<sup>17</sup> 35,453	Ar Аргон	<sup>18</sup> 39,948			
IV	4	K Калий	<sup>19</sup> 39,102	Ca Кальций	<sup>20</sup> 40,08	Sc Скандий	<sup>21</sup> 44,956	Ti Титан	<sup>22</sup> 47,90	V Ванадий	<sup>23</sup> 50,942	Cr Хром	<sup>24</sup> 51,996	Mn Марганец	<sup>25</sup> 54,9380	Fe Железо	<sup>26</sup> 55,847	Co Кобальт	<sup>27</sup> 58,9330	Ni Никель
	5	29 63,546	Cu Медь	30 65,37	Zn Цинк	Ga Галлий	<sup>31</sup> 69,72	Ge Германий	<sup>32</sup> 72,59	As Мышьяк	<sup>33</sup> 74,9216	Se Селен	<sup>34</sup> 78,96	Br Бром	<sup>35</sup> 79,904	Kr Криптон	<sup>36</sup> 83,80			
V	6	Rb Рубидий	<sup>37</sup> 85,47	Sr Стронций	<sup>38</sup> 87,62	Y Иттрий	<sup>39</sup> 88,905	Zr Цирконий	<sup>40</sup> 91,22	Nb Ниобий	<sup>41</sup> 92,906	Mo Молибден	<sup>42</sup> 95,94	Tc Технеций	<sup>43</sup> [99]	Ru Рутений	<sup>44</sup> 101,07	Rh Родий	<sup>45</sup> 102,905	Pd Палладий
	7	47 107,868	Ag Серебро	48 112,40	Cd Кадмий	In Индий	<sup>49</sup> 114,82	Sn Олово	<sup>50</sup> 118,69	Sb Сурьма	<sup>51</sup> 121,75	Te Теллур	<sup>52</sup> 127,60	I Иод	<sup>53</sup> 126,9044	Xe Ксенон	<sup>54</sup> 131,30			
VI	8	Cs Цезий	<sup>55</sup> 132,905	Ba Барий	<sup>56</sup> 137,34	La* Лантан	<sup>57</sup> 138,91	Hf Гафний	<sup>72</sup> 178,49	Ta Тантал	<sup>73</sup> 180,948	W Вольфрам	<sup>74</sup> 183,85	Re Рений	<sup>75</sup> 186,2	Os Осмий	<sup>76</sup> 190,2	Ir Иридий	<sup>77</sup> 192,2	Pt Платина
	9	79 196,967	Au Золото	80 200,59	Hg Ртуть	Tl Таллий	<sup>81</sup> 204,37	Pb Свинец	<sup>82</sup> 207,19	Bi Висмут	<sup>83</sup> 208,980	Po Полоний	<sup>84</sup> [210]*	At Астат	<sup>85</sup> [210]	Rn Радон	<sup>86</sup> [222]			
VII	10	Fr Франций	<sup>87</sup> [223]	Ra Радий	<sup>88</sup> [226]	Ac** Актиний	<sup>89</sup> [227]	Rf Резерфордий	<sup>104</sup> [261]	Db Дубний	<sup>105</sup> [262]	Sg Сиборгий	<sup>106</sup> [263]	Bh Борий	<sup>107</sup> [262]	Hs Хассий	<sup>108</sup> [265]	Mt Мейтнерий	110	

Лантаноиды*	58 140,12	Ce Церий	59 140,907	Pr Празеодим	60 144,24	Nd Неодим	61 [147]*	Pm Прометий	62 150,35	Sm Самарий	63 151,96	Eu Европий	64 157,25	Gd Гадолиний	65 158,924	Tb Тербий	66 162,50	Dy Диспрозий	67 164,930	Ho Гольмий	68 167,26	Er Эрбий	69 168,934	Tm Тулий	70 173,04	Yb Иттербий	71 174,97	Lu Лютесций
Актиноиды**	90 232,038	Th Торий	91 [231]	Pa Протактиний	92 238,03	U Уран	93 [237]	Np Нептуний	94 [244]	Pu Плутоний	95 [243]	Am Америций	96 [247]	Cm Кюрий	97 [247]	Bk Берклий	98 [252]*	Cf Калифорний	99 [254]	Es Эйнштейний	100 [257]	Fm Фермий	101 [257]	Md Менделевий	102 [255]	No Нобелий	103 [256]	Lr Лоуренсий